
FICHE RETEX N°15
MÉDICAMENT

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS TROUVEREZ LA FICHE COMPLÈTE EN CLIQUANT CI-DESSUS

ERREUR D'ADMINISTRATION D'UNE SOLUTION BUVABLE EN PÉDIATRIE

ENFANT DE 8 ANS PORTEUR D'UNE GASTROSTOMIE



DÉGRADATION CLINIQUE

SCORE DE GLASGOW À 3

DÉSATURATION

ENCOMBREMENT BRONCHIQUE

MYOCLONIES BUCCALES

ANALYSE

DOSE PRESCRITE : 5 mg

DOSE ADMINISTRÉE : 5 mL = 200 mg

ERREUR DE DOSE DE LAROXYL BUVABLE

- CONFUSION D'UNITÉS
- PAS D'ADAPTATEUR DISPONIBLE POUR L'ADMINISTRATION PAR SONDE
- ADMINISTRATION PAR SONDE DE GASTROSTOMIE
- OBLIGATION D'UTILISER UN DISPOSITIF D'ADMINISTRATION INADAPTÉ
- INTERRUPTION DE TÂCHES
- NON-UTILISATION DE LA SERINGUE DOSEUSE CAR INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ORIFICE DE GASTROSTOMIE

ADMINISTRATION DE GOUTTES BUVABLES

- ☐ PORTER UNE VIGILANCE ACCRUE AUX POSOLOGIES LORS DE LA PRESCRIPTION (mL ≠ mg, PROTOCOLES SPÉCIFIQUES, ...)
- ☐ ADAPTER LA DOSE ET LA GALÉNIQUE À L'ÂGE ET AU POIDS
- ☐ 1 MÉDICAMENT = 1 DISPOSITIF D'ADMINISTRATION = 1 PATIENT
- ☐ UTILISER LE DISPOSITIF FOURNI ET TOUJOURS LE CONSERVER AVEC LE MÉDICAMENT
- ☐ VÉRIFIER LA CONCORDANCE ENTRE LA GRADUATION DU DISPOSITIF ET L'UNITÉ DE PRESCRIPTION

ADMINISTRATION PAR GASTROSTOMIE

- ☐ TOUJOURS PRÉLEVER LA DOSE AVEC LE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION SPÉCIFIQUE AU MÉDICAMENT
- ☐ ADMINISTRER CETTE DOSE, DILUÉE À L'EAU 1:2 OU NON, AVEC LE DISPOSITIF ET UN ADAPTATEUR COMPATIBLE AVEC LA CONNECTIQUE ENFIT DE LA SONDE, OU UNE SERINGUE ENFIT

Structure Régionale d'Appui Grand Est

Omedit Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique Grand Est

© Structure Régionale d'Appui Grand Est - 2025